



МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



Изпълнителна агенция
по горите

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ — УЧАСТНИЦИТЕ В ЛОВНИ ИЗЛЕТИ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ

*Уважаеми ловци,
помогнете да не допуснем АЧС в България!*

Африканската чума по свинете (АЧС) е тежка вирусна инфекция при домашни и диви свине, която е смъртоносна за тях, но не представлява опасност за други животински видове и за хората. Човекът е съществен фактор при разпространението на това заразно вирусно заболяване, което наред с въздействието върху дивата свиня може да доведе до сериозни икономически последици за свиневъдството.



Към юни 2018 г. АЧС се среща при домашни и диви свине в държавите членки на ЕС: Италия (остров Сардиния), Полша, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Румъния и Чехия. Освен това тя е установена и в страни извън ЕС – Грузия, Украйна, Беларус, Молдова и Русия.

Все още на територията на България това заболяване не е установено, но съществува риск да бъде пренесено от съседните държави, тъй като засега не е открита ваксина, чрез която да бъде ограничено.



Призоваваме ловците за максимална предпазливост, когато участват в ловни пътувания в страни с установени огнища на АЧС.

Какво могат да направят участниците в лова и в ловните пътувания?

Вирусът на АЧС се предава както пряко чрез контакт между животните, така и непряко (например чрез кръв, изпражнения, телесни течности и тъканни остатъци). Ловни трофеи и хранителни продукти – напр. шунка и колбаси, преминали недостатъчна топлинна обработка, могат да бъдат заразни в продължение на няколко месеца. Вирусът издържа в широк диапазон на температури и рН, не е чувствителен на студ, краткосрочно загряване, осоляване и опушване.

Участниците в лова и в ловните пътувания носят съществена отговорност за недопускане разпространението на вируса. Поради това е важно да се обърне внимание на следните указания:

1. Почистване и дезинфекция




- Избягвайте замърсяването на ловно оборудване, ловни кучета, облекло, обувки, уреди и превозни средства с кръв от свине. При работа с отстреляни или умрели животни носете ръкавици за еднократна употреба.
- Всички предмети, които са били в контакт с диви свине, кръв, изпражнения, телесни течности или тъканни остатъци от диви свине (напр. ловни ножове и други инструменти, ловни ботуши, превозни средства и т.н.), трябва **незабавно да бъдат старателно почистени и дезинфекцирани** още в ловния район.
- Особено внимание трябва да се обърне на остатъци от кръв и тъкани. В тях вирусът на АЧС може да остане заразен за дълго време, дори и най-малките капчици са достатъчни за инфекция. **Моля, използвайте изпитани дезинфектанти.**
- Замърсеното с кръв или други поленнали вещества облекло трябва да бъде транспортирано в затворени наилонови чували и да бъде изпрано при температура най-малко 60°C. Силно замърсени предмети, като напр. напоени с кръв парцали, ръкавици за еднократна употреба и др. трябва да бъдат изгорени на място.

2. Ловни кучета



Отстранявайте ловните кучета от отстреляните животни, което ще предотврати разнасянето на кръв и тъканни остатъци в района.

3. Ловни трофеи и продукти от диви свине



- Носете със себе си ловни трофеи с произход от засегнати от АЧС райони, само ако са основно почистени и дезинфекцирани.
- В никакъв случай не трябва да се пренасят необработени, не дезинфекцирани части от диви свине - кожа, опашки, кости уши и гр., от засегнати от АЧС региони, напр. за обучение на ловни кучета!
- Това важи също за месо, сурови колбаси и други продукти от диви свине, които не са изследвани за наличие на вируса на АЧС.

4. Особена рискова група

Препоръчваме на собственици на домашни свине, както и на членовете на техните семейства и работници в свинеферми да не предприемат ловни изleti в засегнати региони.

Почистване и дезинфекция

- За да бъде унищожен вирусът на АЧС с топлинно третиране, са необходими най-малко 56°C за 70 минути, съответно 60°C за 20 минути.
- Измиването с вода и сапунен разтвор действително може да отстрани голяма част от евентуално поленналите материали, но при вируса на АЧС това няма дезинфекциращ ефект. Задължително е да се използват подходящи дезинфектанти, информация за които можете да получите от местния ветеринарен лекар.



56°C 70 Min.
или
60°C 20 Min.

Допълнителни указания

Допълнителни информационни материали, както и въпроси и отговори относно АЧС можете да откриете на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.

<http://www.babh.government.bg/>

ИЗДАТЕЛ



Югозападно гържавно
предприятие ДП

гр. Благоевград, ул. "Зора" № 18
www.uzdp.bg

Юни 2018 г.